

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

DLP 27-5-71 180396

EDITION DE LA STATION POITOU-CHARENTES

CHARENTE, CHARENTE-MARITIME, DEUX-SÈVRES, VIENNE

12, rue Victor-Hugo - 86 - POITIERS - Tél. : (49) 41.35.55

ABONNEMENT ANNUEL : 25 F.

C. C. P. LIMOGES 4.752.22 W.

Sous Régisseur de recettes et d'avances

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

12, rue Victor-Hugo - 86 - POITIERS

BULLETIN N° 128 - MAI 1971 - Supplément n° 3 -

VIGNE

MILDIOU - BLACK-ROT

Les premiers foyers de mildiou ont été découverts en divers secteurs des Charentes tandis que les premières taches de Black-Rot sont apparues en Charente-Maritime et dans le Haut-Poitou. Les précipitations presque quotidiennes de ces derniers jours seront très certainement à l'origine de nouveaux foyers et de l'extension de ces maladies.

En conséquence, effectuer le plus rapidement possible un traitement de tous les vignobles.

Le temps actuel est très favorable à ces deux maladies, aussi nous recommandons aux viticulteurs d'apporter le maximum de soins dans l'exécution de leurs traitements en respectant les doses homologuées à l'hectare (notamment lors de pulvérisations à volume réduit) et en couvrant bien toute la végétation (traiter tous les rangs, et des deux côtés).

Enfin, nous rappelons qu'après toute pluie supérieure à 20 mm, il convient de renouveler le traitement précédent qui a été lessivé, sans attendre un avis de la Station.

OIDIUM - Sur les cépages sensibles, adjoindre à la bouillie un produit anti-oidium.

VERS DE LA GRAPPE

Le temps actuel est défavorable à l'éclosion des quelques oeufs qui ont été déposés. Aucun traitement ne se justifie pour l'instant. Toutefois, surveiller les parcelles où des attaques importantes ont été décelées à l'automne 1970, et intervenir si nécessaire.

POISSONS - POISSONS

TAVELURES

Les projections d'ascospores continuent, mais leur intensité décroît. Des taches sont en cours d'apparition ; d'autre part, les pluies presque quotidiennes ont diminué sensiblement l'efficacité du traitement précédent. Il est donc nécessaire de renouveler la protection dans tous les vergers, le plus rapidement possible.

OIDIUM DU POMMIER - Continuer la protection sur les variétés sensibles.

CARPOCAPSE - Il est encore trop tôt pour intervenir.

PUCERONS

L'on observe actuellement, dans certains vergers, une reprise d'activité des pucerons cendrés. Si nécessaire, intervenir à l'aide d'un insecticide systémique, et si l'on note également la présence de Tétranyques, utiliser un produit efficace vis-à-vis de ces deux ravageurs. (Voir le Bulletin n° 126 pour la liste des produits).

POISSONS - POISSONS

MILDIOU

En raison des conditions climatiques actuelles très favorables à cette maladie, nous conseillons d'appliquer un traitement dès que possible, notamment dans les cultures destinées à la production de plants de semence.

Le Chef de la Circonscription Phytosanitaire
"Poitou-Charentes"
F. BARBOTIN

Les Contrôleurs chargés des
AVERTISSEMENTS AGRICOLES
R. HUDE - H. BOUE

Imprimé à la Station, le 26 MAI 1971 - Précédente note : Bulletin n° 128 - Supplément n° 2.-